

ENHER CUAJE

CARACTERÍSTICAS

Enher Cuaje puede aplicarse sobre cualquier cultivo para suministrar la cantidad necesaria de Molibdeno, Fósforo, Boro, entre otros elementos tan importantes en los procesos de floración y posterior fructificación de las plantas. Al Aplicar Enher Cuaje al inicio de la floración obtenemos una mayor floración y cuajado así como una fructificación de mayor calidad y cantidad.

Puede aplicarse en todo tipo de cultivos hortícolas tales como calabacín, tomate, pimiento, pepino, sandia, melón, berenjena, y judía.

COMPOSICIÓN

COMPOSICIÓN	RIQUEZA(%p/p)
Molibdeno(Mo)	5,40
Boro(B)	3,00
Anhídrido fosfórico(P2O5)	15,00
Nitrógeno Total(N)	6,00
Nitrógeno Amoniacal	6,00
Coadyuvantes especiales	5,00
Exento de Cloro.	

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Calabacín y pepino	400cc/Hl en prefloración
Tomate	500cc/Hl en prefloración.
Melón y Sandia:	100-150cc/Hl en estado de 4 hojas, seguida de dos aplicaciones con intervalo de 10 días.
Pimiento	400 cc/Hl en prefloración
Berengena	400cc/Hl en Prefloración
Cítricos , vid y olivo	

FORMATO
1Lt.

AMINOÁCIDOS Y BIOESTIMULANTES

ENHER CUAJE

